# vertissement

GRANDES CULTURES

Bulletin technique n°5 du 7 avril 1988

- \* CHARANCON DE LA TIGE: Stade sensible souvent dépassé
- \* MELIGETHES: Soyez vigilants ... BLE
- \* RACCOURCISSEURS DE PAILLE: Respectez le stade d'application
- \* DESHERBAGE: Anti-graminées utilisables à partir du stade "épi 1 cm"

### COLZA


CHARANCON DE LA TIGE: STADE SENSIBLE SOUVENT DEPASSE

#### ➤ Situation

- · Vol faible ou nul en toutes régions sauf secteur de Seebach où des captures plus abondantes ont été enregistrées les 3 et 4 avril.
- Les colzas ont fortement poussé depuis notre dernier bulletin et la majorité des parcelles a atteint ou dépassé le stade "tige 20 cm".

#### Nos conseils:

- ► Cas général: un traitement spécifique contre le charançon de la tige n'est pas justifié cette année.
- ► Secteur de Seebach: dans les colzas qui n'ont pas atteint le stade "tige 20 cm", on peut en présence de nombreuses piqures, réaliser une intervention mixte "charançon-méligèthes". Il suffit choisir un insecticide efficace contre les deux insectes et de l'appliquer à la dose la plus élevée (voir tableau page 2).



Stade "tige 20 cm" fin de la période de sensibilité au charançon de la tige.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG Directeur-Gérant: P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE D.R.A.F. Service Régional de la Protection des Végétaux Cité Administrative 67084 STRASBOURG CEDEX

75° 88.37.32.15 Bas-Rhin: 88,69,65.89 - Haut-Rhin: 89,72,49,79



Publication périodique CPPAP nº 1847 AD Abonnement annuel: 180,- F

#### MELIGETHES: SOYEZ VIGILANTS


1 1 1 1 1 W.

• L'activité des méligèthes a débuté dans plusieurs postes de piégeage (Gambsheim, Fessenheim-68-,...) depuis le 2 avril; des captures importantes ont été enregistrées à Rouffach le 5 avril.

•L'infestation des boutons floraux reste faible pour l'instant.

#### ► Nos conseils:

Surveillez très attentivement vos cultures et intervenez si vous dénombrez la présence d'au moins un méligèthe par bouton floral. Le colza est sensible aux dégats de cet insecte jusqu'à l'ouverture des premières fleurs.



Méligèthe adulte: petit insecte noir à reflets métalliques mesurant 1,5 à 2,5 mm.

## PRODUITS UTILISABLES (dose 1. ou kg./ ha - charançon de la tige/méligèthe)

Fastac (0,15/0,2); Talstar flo (0,075/0,1); Nexion 25, Sovinexion 25 (\*/2); Nexion 40, Nexion EC 40 (\*-1,4); Baythroïd (0,3/0,2); Karaté (0,15/0,1); Cymbush, Kafil super (0,25/0,25); Décis (0,3/0,2); Torak (\*/1,25); endosulfan (400 g m.a./250 g m.a.); Sumicidin 10 (\*/0,4); Mavrik (\*/0,2); lindane (300 g m.a./200 g m.a.); malathion (\*/1.5 l ou kg); Ultracide 20 (1,5/1,25); parathion (300 g m.a./200 g m.a.); Zolone, Azofène flo (\*/2); Drifène AP, Ekadrine PE (1,25/0,75); Sopragam (1,5/1); Paralindex (2,5/1,75); Fortène, Taxylone (1,5/0,75).

(\* : non autorisé contre charancons de la tige.)

#### BLE

#### RACCOURCISSEURS DE PAILLE: RESPECTEZ LE STADE D'APPLICATION

- Les semis précoces de blé ont atteint et parfois dépassé le stade "épi à 1 cm".Les régulateurs à base de C.C.C. peuvent être appliqués au plus tard jusqu'au stade "épi à 2 cm"; seul Cycocel CL peut encore s'employer jusqu'au stade "1er noeud".
- •Au delà, il faudra avoir re- de cours aux régulateurs à base d'éthéverse (voir dépliant vert).
- ► Compatibilité: ne pas mélanger les produits type Cycocel avec les herbicides en formulation ester ou les colorants nitrés (les formulations sont indiquées sur les emballages et sur le dépliant vert).

#### DESHERBAGE: ANTI-GRAMINEES UTILISABLES A PARTIR DU STADE EPI 1 CM

Some strategies of the some

of an of our probable hours in 1990 to 1990. Not visited years

- Certains désherbages antigraminées n'ont pas encore été réalisés; à partir du stade "épi à 1 cm", trois spécialités demeurent sélectives des blés et orges d'hiver:
- \* ILLOXAN CE: (2 à 2,5 l/ha); cace co efficace contre folle avoine et fisant ray grass, insuffisant contre tide; vulpin et agrostide. vulpin.
- \* GRASP: (31+11/ha); efficace contre folle avoine et ray grass; actif sur agrostide et vulpin jeunes (jusqu'au stade trois feuilles).
- \* SUFFIX 425: (31/ha); efficace contre folle avoine; insuffisant contre ray grass et agrostide; efficacité moyenne contre vulpin.

DETON A MARKET TO BUTCH

JOHN WEST DAIL HOW PREME AL